

PRISE EN CHARGE REGIONALE DE L'HPP

Heure du diagnostic
Modalité d'accouchement
Voie basse / Césarienne
Volume pertes sanguines :

	FAIT	HEURE
Scope		
Monitoring PA		
SpO2		
1 ^{re} Hemocue		
Appel CTS		

(mise en réserve culots)

Appel immédiat

Obstétricien de garde :
Anesthésiste :
Interne gynéco :
IADE :

(1) Antibiothérapie
Augmentin® : 2g perfusette
Dalacine® : 900mg dans 50ml en 20mn si allergie

(2) SYNTOCINON® Frigo ❄️
5 à 10 Ui en IVD puis 5 à 10 UI en IVL pendant 2 heures

(3) 1^{er} BILAN :
Vérifier groupe/RAI
(NFS, plaq, TP, TCA, Fibrinogène, PDF, + 1 tube sec pour Test Coagulopathie, iono, calcémie ionisée)

(4) EXACYL®
15 mg/Kg
1g en IVL sur 20mn puis 1g/8H puis STOP

(5) GLUCONATE DE CA
2 AMP en IVL sur 4 à 5 mn (robinet distal)

(6) Sulprostone NALADOR®
1^{re} amp de 500µg dans 50ml : PSE 50ml/H
2^{me} amp de 500µg dans 50ml : PSE 10ml/h
3^{me} amp en fonction de l'évolution

(7) PABAL®
1 amp de 1ml(100γ) dans perfusette de 50ml sur 1 à 3 mn
Débuter l'injection au dégageage de l'épaule antérieure


(8) 2^{me} BILAN
idem 1^{er} bilan + Troponine

(9) CLOTTAFAC® Frigo ❄️
2 à 3 flacons de 1,5g

Seuils à atteindre
Fibrinogène 1-3gr (pour Fg>1.5-2g/L)
CG : pour Hb 9-10g/dL
PFC : ratio= 1 pour 1 CG
Plaquettes dès 5 CG (pour >75-100 G/L)
CaCl2 1 ampoule IVL (pour 5 CG)

(10) NOVOSEVEN®
60 à 90µg/kg (que si hémostase biologique contrôlée)

Numéros utiles :
MAR Salle d'urgence :
MAR service de surveillance continue post op :
GYNECO : DECT :
MAR : DECT :
SAMU : 15 ou 6000
CTS Tél : Fax :



Si transfert : copie du recto et verso à remettre au centre receveur

IDENTITE PATIENTE		Date : / /		Obstétriciens/Internes :		Anesthésistes/Internes/IADE :		Sages-femmes :		Heure diagnostic HPP		
		Carte GS 2 déter : oui/non RAI : +/- le / /						Famille prévenue ? : OUI / NON Personne à contacter :				
		Modalité d'accouchement		terme :		D.A R.U		Examen ss Valves		Tamponnement/Ballon Interne		Remarques :
Evénements	Embolisation		OUI		NON		OUI		NON		Volume pertes sanguines :	
	Chirurgie (quoi et quand)											
	Heures d'appel (qui et quand)											
	Heures											
BILANS	TA											
	Pouls											
	Température											
	Tonus utérin (0/1/2)											
	Pertes Sg RELEVÉES (ml)											
Pertes Sg CUMULÉES (ml)(+ drain si césarienne)												
Hémocue												
Diurèse horaire												
Diurèse cumulée												
Oxygène (Débit)												
Couv. Chauffante (T)												
Syntocynon® (U.I)												
Nalador® 500/50ml vitesse : ml :h												
Exacyl®												
Cacl2												
Clotfact®												
Novoseven®												
Remplissage/ Transfusion	Ringer											
	Plasmion											
	Voluven...											
	Culot globulaire (N°)											
	Culot plaquettaire (N°)											
Plasma frais congelés												
Antibiothérapie												
AG / RACHI ANESTHESIE / PERIDURALE												
Antalgique s :	Perfalgan											
	Morphine (voie et dose)											
	Si PCA, Dose morphine cumulée											
	Autres											
BILANS	Hb											
	Hématocrite											
	G.B											
	Plaquettes											
	Protides											
	TP											
	TCA											
	Fibrinogène											
	D Dimères/PDF											
	Autres facteurs de coagulation											
	Calcémie (calcium ionisé)											
	Troponine											
Autres :												

Feuille Surveillance HPP Obstétricale

Si transfert : copie du recto et verso à remettre au centre receveur