

## Critères de suivi ambulatoire

Patiente avec **AU MOINS** une comorbidité

- Aucun des critères cliniques suivants :
  - ❖ FR  $\geq$  25/ min
  - ❖ Saturation en O<sub>2</sub> < 94 % en AA
  - ❖ Pouls > 100 bpm
  - ❖ Signes de détresse respiratoire aigue
  - ❖ Etat de choc
  - ❖ Dyspnée

**ET**

- Suivi ambulatoire dans de bonnes conditions sociales :
  - ❖ Passage d'une IDE à domicile quotidiennement
  - ❖ Passage d'une SF à domicile quotidiennement si > 26SA

**ET**


- Domicile de la patiente < **45 min** du CHU

Patiente sans **AUCUNE** comorbidité

- Aucun des critères cliniques suivants :
  - ❖ FR  $\geq$  25/ min
  - ❖ Saturation en O<sub>2</sub> < 94 % en AA
  - ❖ Pouls > 100 bpm
  - ❖ Signes de détresse respiratoire aigue
  - ❖ Etat de choc
  - ❖ Dyspnée

**ET**

- Suivi ambulatoire dans de bonnes conditions sociales :
  - ❖ Passage d'une IDE à domicile quotidiennement
  - ❖ Passage d'une SF à domicile quotidiennement si > 26SA



**Signes de gravité :**


- SaO<sub>2</sub> < 94% en AA
- FR > 30/min
- Détresse respiratoire aigue
- État de choc

## Modalités du suivi ambulatoire

### 1. DURÉE DU SUIVI AMBULATOIRE ET ISOLEMENT STRICT A DOMICILE :

PATIENTES COVID +		
Asymptomatique	Symptomatique	Passée par la réanimation
Isolement 10 jours à partir du résultat PCR +	Isolement 17 jours à partir du J1 des symptômes	Isolement 21 jours

### 2. VÉRIFICATION DES CRITERES D'ÉLIGIBILITE AU SUIVI AMBULATOIRE :



*Une patiente qui a une PCR Covid + est contagieuse selon les définitions de la période d'isolement écrites, après cette période elle n'est plus contagieuse et **ne doit plus avoir de contrôle PCR Covid** (même si hospitalisation ou césarienne, ...) pendant les 3 mois qui suivent, car la PCR Covid pourrait revenir positive alors qu'elle n'est plus contagieuse.*

### 3. SUIVI DE GROSSESSE DES PATIENTES COVID + APRES PHASE AIGÛE :

- Consultation obstétricale à 3 semaines de la guérison : faire le point, évaluer le vécu, retentissement sur l'entourage.
- Prévoir **Echo obstétricale de dépistage** (en ville ou au CHU) selon les modalités ci-dessous :

